

Galenisch optimiert: Mepha-Suspensionen



Jedes Kind ist gelegentlich krank. Nicht mehr herumtollen zu dürfen und das Bett hüten zu müssen, ist für die meisten kleinen Patienten eine grosse Belastung. Erschwerend kommt oft dazu, dass ihnen die Medizin nicht schmeckt: Gerade Antibiotika haben in der Regel ein unangenehmes Aroma. Geschmacklich optimierte Suspensionen und andere Hilfsmittel können die Therapie unterstützen.

Die «gelbe» Palette von Mepha umfasst zahlreiche Antiinfektiva in unterschiedlichen Formen und Dosierungen für die Behandlung der wichtigsten Infektionskrankheiten. Ob Lactab®, Filmtabletten, Kapseln, Suspensionen oder Ampullen zur parenteralen Verabreichung: Besonders viel Wert legt Mepha auf spezielle galenische Formen, welche den Patienten – ob klein oder gross – Vorteile bei der Einnahme bieten.

Bananen, Himbeeren und andere

Rückmeldungen aus dem Markt zeigen, dass aromatisierte Antibiotikasuspensionen die Verabreichung an Kinder erleichtern können. Zahlreiche Suspensionen mit unterschiedlichen Aromen sind in der Mepha-Palette verfügbar. Bei einzelnen empfiehlt es sich aufgrund ihrer Bitterkeit – beispielsweise Clarithromycin –, dennoch sofort etwas zu trinken.

Spitzenreiter der Schweizer Antibiotika: Co-Amoxi-Mepha®

Co-Amoxi-Mepha® (Amoxicillin/Clavulansäure) ist das meistverwendete Antibiotikum im Schweizer Markt (IHA, 9/2007, Menge). Co-Amoxi-Mepha® gibt es als Suspension mit Erbeer- oder Kirscharoma (Einnahme dreimal täglich): Besonders häufig wird aber die Suspension Co-Amoxi-Mepha® 457 angewendet. Diese ist als Aromamix aus Himbeere, Orange und Caramel erhältlich. Neben geschmacklichen Aspekten bietet Sie einen weiteren Vorteil: Zwei an Stelle von drei Einnahmen täglich.

Himbeer-Orange-Caramel-Aroma: Co-Amoxi-Mepha® 457 wird besonders häufig angewendet.

Aroma	Produkt	Packungsgrösse
Himbeere	Co-Amoxi-Mepha® 156,25	100 ml Suspension
Kirsche	Co-Amoxi-Mepha® 312,5	100 ml Suspension
Kombination aus Caramel, Himbeer, Orange	Co-Amoxi-Mepha® 457	35 ml Suspension
		70 ml Suspension
		140 ml Suspension
Himbeere	Amoxi-Mepha® 100 mg/4 ml	80 ml Suspension
	Amoxi-Mepha® 200 mg/4 ml	80 ml Suspension
Kirsche	Clarithrocin-Mepha® 125	100 ml Suspension
	Clarithrocin-Mepha® 250	100 ml Suspension
Banane	Nopil®	100 ml Sirup
Caramel	Azithromycin-Mepha® 200	15 ml Suspension
		30 ml Suspension

Mepha-Antibiotika: Service inklusive auch für kleine Patienten

Die regelmässige Einnahme eines Antibiotikums ist für den Therapieerfolg von grosser Bedeutung. Um Eltern die Verabreichung eines Antibiotikumsirups zu erleichtern, hat Mepha eine Bakterienkarte erstellt, die kleinen Kindern grossen Spass bereitet. Schluckt das Kind seine Medizin regelmässig, darf es sich jeweils morgens und abends auf die Suche nach einem Bakterium machen. Das Abziehbild kann es dann auf die Vorlage kleben und so das Bakterium in den Turm einschliessen. In der Regel ist nach maximal zehntägiger Therapie die Behandlung abgeschlossen, der Turm komplett, und alle kleinen Käfer sind weggesperrt.

Für Fachpersonen bietet Mepha zusätzlich die Antibiotikadosierungstabelle für Kinder an. Eine Übersicht der unterschiedlichen Mepha-Antibiotika und deren Dosierungsrichtlinien erleichtert den täglichen Einsatz.

Gekürzte Fachinformationen Co-Amoxi-Mepha® 457

Co-Amoxi-Mepha® 156,25/312,5; Pulver zur Zubereitung von 100 ml Suspension: Verhältnis 4:1. Co-Amoxi-Mepha® 457; Pulver zur Zubereitung von 35, 70 und 140 ml Suspension: Verhältnis 7:1. Antibiotikum (Aminopenicillin kombiniert mit Clavulansäure)
Z: Suspension 156,25/312,5/457 (5 ml): Amoxicillinum anhydricum 125 mg/250 mg/400 mg und Acidum clavulanicum 31,25 mg/62,5 mg/57 mg. **I:** ORL-Infektionen, Infektionen der unteren Atemwege, Harnwegsinfektionen, GI-Infektionen, venerische Erkrankungen, Haut- und Weichteilinfektionen, gynäkologische Infektionen. **D:** Co-Amoxi-Mepha 156,25 und 312,5 Suspension: Kinder unter 2 Jahren: 25–50 mg/kg/Tag unterteilt in 3 Einzeldosen. Über 2 Jahre leichte bis mittelschwere Infekte: 25–37,5 mg/kg/Tag, schwere Infekte: 50–75 mg/kg/Tag unterteilt in 3 Einzeldosen. Co-Amoxi-Mepha 457 Suspension: Tagesdosis in 2 Einzeldosen: Tonsillitis und leichte bis mittelschwere Infektionen der unteren Luftwege Kinder ab 2–12 Jahren (13–40 kg) 2 × tägl. 2, 5 – max. 7,5 ml je nach KG. Akute Otitis media Kinder ab 2–12 Jahren (13–40 kg) 2 × tägl. 5 ml – max. 12,5 ml je nach KG. Genaue Angaben und spezielle Dosierungsanweisungen siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz. **KI:** Überempfindlichkeit gegen Penicilline, Cephalosporine oder gegen einen Inhaltsstoff von Co-Amoxi-Mepha. Ikterus oder hepatische Dysfunktionen nach früherer Einnahme eines Medikaments dieser Wirkstoffkombination. Infektiöse Mononukleose, lymphatische Leukämie. **V:** Eingeschränkte Nieren- oder Leberfunktion. Langzeitbehandlung, Überempfindlichkeitsreaktionen, anaphylaktische Reaktionen, Einnahme von Antikoagulantien, schwere, anhaltende Durchfälle, pseudomembranöse Colitis. Schwangerschaftskategorie: **B**. **UW:** Überempfindlichkeitsreaktionen und ZNS-Symptome. Nieren-, GI-, Leberreaktionen, Blutbildveränderungen, Verlängerung der Blutungszeit und Prothrombinzeit, Zahnverfärbung, mukokutane Candidosis. **IA:** Probenecid, bakteriostatische Antibiotika, Glykoside, Allopurinol, Alkohol. Kassenzulässig. Liste: A
 Weiterführende Informationen siehe Arzneimittel-Kompendium.