

Rheumatoide Arthritis

Leitliniengerechte Therapie orientiert sich an der Krankheitsaktivität

Die Empfehlungen der European League Against Rheumatism (EULAR) sehen für das Management der rheumatoiden Arthritis einen mehrstufigen Algorithmus vor, der den Beginn der Therapie mit einem synthetischen DMARD vorsieht. Bei Bedarf wird zusätzlich ein Biologikum oder ein JAK-Inhibitor gegeben. Weniger klar ist die Frage zu beantworten, ob und wann man diese Therapie wieder deeskalieren kann.

Die Grundlage für die Therapie der rheumatoiden Arthritis (RA) bildet die Bewertung der Krankheitsaktivität anhand etablierter Scores wie dem DAS28 (Disease Activity Score 28), dem CDAI (Clinical Disease Activity Index) oder dem SDAI (Simplified Disease Activity Index). Alle diese Instrumente beruhen auf der Zählung schmerzhafter und/oder geschwollener Gelenke, klinischer Einschätzung sowie zumeist ergänzender Laborparameter. Die Verwendung dieser Scores verbessere die Aussichten auf eine erfolgreiche Kontrolle der Erkrankung, wie Prof. Diego Kyburz vom Universitätsspital Basel ausführte. Studiendaten zeigen, dass Patienten unter DAS-gesteuerter Therapie eine deutlichere Reduktion der radiologischen Progression erreichen als Patienten unter «Standard care» (1). Angesichts der Fortschritte, die in der Bildgebung in den vergangenen Jahren erzielt wurden, stellt sich nun die Frage, ob diese – und dabei insbesondere der Ultraschall – relevante Zusatzinformationen generieren kann. Dass der Nachweis einer subklinischen Synoviitis mittels Ultraschall möglich ist, wurde in Studien gezeigt. Eine subklinische Synoviitis, wie sie bei rund einem Drittel der Patienten in DAS28-Remission nachweisbar ist (2), konnte auch als Prädiktor von «flares» und radiologischer Progression identifiziert werden.

Ultraschall bringt keinen Vorteil in der Therapiesteuerung

Die Frage, ob die Bildgebung in die Therapieentscheidungen einbezogen werden sollte, wurde mittlerweile in grösseren Studien gestellt und beantwortet. In der ARCTIC-Studie wurde ein engmaschiges Monitoring mittels Ultraschall in einem Kollektiv von DMARD-naiven Patienten mit früher RA evaluiert. Dabei wurden beide Gruppen intensiv behandelt und mit unterschiedlichen Strategien (DAS44 vs. DAS44 plus Ultraschall) monitiert. Die Studie zeigte über zwei Jahre in der Ultraschallgruppe eine intensivere Therapie mit mehr Biologikaeinsatz, dabei aber keine höhere Rate klinischer Remissionen. Daraus schlossen die Autoren, dass Ultraschallmonitoring im Rahmen einer Treat-to-Target-Strategie keinen zusätzlichen Nutzen bringt (4).

Die Therapie einer RA erfolgt nach dem von der europäischen Rheumatologengesellschaft EULAR vorgeschlagenen

Stufenschema (5). In Phase I wird die Therapie mit einem konventionellen DMARD begonnen, mit dem nach 3 Monaten eine Besserung und nach 6 Monaten das Therapieziel erreicht werden sollte. Nach wie vor ist Methotrexat (MTX) erste Wahl. Bei Kontraindikationen oder Unverträglichkeit stehen Leflunomid oder Sulfasalazin als alternative konventionelle DMARD (csDMARD) zur Verfügung. Der kurzzeitige Einsatz von Glukokortikoiden in Kombination mit MTX wird empfohlen. Gelingt das, wird die Therapie weitergeführt. Wird das Ziel nicht erreicht, stehen mehrere Optionen offen, und das weitere Vorgehen orientiert sich an Prognosefaktoren. Sind diese günstig, wird die Therapie durch ein weiteres csDMARD ergänzt oder die Umstellung auf ein anderes csDMARD versucht, bei ungünstiger Prognose ist die Therapie mit einem Biologikum oder einem JAK-Inhibitor indiziert. Solche ungünstigen prognostischen Faktoren sind unter anderem eine hohe Krankheitsaktivität, das Versagen zweier synthetischer DMARD oder das Vorhandensein von Rheumafaktor oder ACPA, insbesondere bei hohem Titer.

Die EULAR-Empfehlungen geben keine Hinweise, mit welchem Biologikum die Therapie zuerst eskaliert werden soll oder ob nicht einem JAK-Inhibitor der Vorzug zu geben ist. Hinsichtlich der Wirksamkeit fanden Metaanalysen der grossen klinischen Studien keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Biologika (5). Für die JAK-Inhibitoren gäbe es allerdings mittlerweile Hinweise auf eine Überlegenheit, so Kyburz, da in grossen Phase-III-Studien die Überlegenheit nicht nur gegenüber Plazebo, sondern auch gegenüber Adalimumab als «Standardbiologikum» demonstriert worden sei (6,7). Hinsichtlich der Sicherheit zeigt sich ein ganz ähnliches, uniformes Bild (8).

Auf der Suche nach neuen Biomarkern

Nach wie vor gibt es keine klinischen oder prädiktiven Biomarker, die bei der Wahl des ersten Biologikums helfen können. Allenfalls könnten, so Kyburz, individuelle Hinweise auf potenzielle Sicherheitsprobleme die Wahl erleichtern. So wird man bei Patienten mit hohem Infektionsrisiko ein Biologikum mit kurzer Halbwertszeit bevorzugen und bei hohem Tuberkuloserisiko auf einen TNF-Inhibitor verzichten

ten. Besteht eine Divertikulitis, sollte eine IL-6-Blockade vermieden werden, da diese das Risiko einer Darmperforation erhöht. Auch Patientenpräferenzen können eine Rolle spielen. Möglicherweise könnte in Zukunft eine Synovialbiopsie Klarheit bringen. Jedenfalls zeigen aktuelle Studiendaten, dass histologische Subtypen definiert werden können, die mit besserem oder schlechterem Ansprechen auf Certolizumab pegol assoziiert sind (9). Ein noch differenzierteres Bild kann gezeichnet werden, wenn die Gentranskription in den Zellen der Synovia analysiert wird (10).

Deeskalation – wann und bei wem?

Bei Patienten in lange anhaltender Remission stellt sich die Frage, wie weit eine Deeskalation der Therapie möglich ist. Kyburz wies in diesem Zusammenhang auf die PRIZE-Studie hin, in der Patienten mit früher RA erst offen mit Etanercept und MTX bis zum Erreichen von Remission behandelt wurden. Nach einem Jahr wurden die Patienten doppelblind in drei Arme randomisiert und entweder mit Etanercept in reduzierter Dosierung plus MTX weiterbehandelt, auf eine MTX-Monotherapie umgestellt, oder es wurde überhaupt die gesamte Basistherapie abgesetzt. Nach weiteren 39 Wochen wurde bei allen Patienten die Basistherapie abgesetzt. Die Studie zeigt, dass ein Absetzen des Biologikums und noch mehr der gesamten Basistherapie bei einem hohen Prozentsatz der Patienten zum Verlust der Remission führt, während die Patienten unter reduzierter Dosis von Etanercept zu 90 Prozent in Remission blieben (11).

Eine weitere praxisrelevante Frage ist die nach dem oft von den Patienten gewünschten Absetzen von MTX unter Biologikatherapie. Die Daten aus klinischen Studien sprächen dagegen und zeigten zumindest für die TNF-Inhibitoren in Kombination mit MTX besseres Ansprechen als in Monotherapie, wobei die Unterschiede, so Kyburz, bei den verschiedenen Biologika unterschiedlich ausgeprägt seien. Die EULAR empfiehlt grundsätzlich die Kombination von Biologika mit MTX. Ist dies nicht möglich, soll ein Biologikum, das in den IL-6-Signalweg eingreift, oder ein JAK-Inhibitor gewählt werden (4). Allerdings zeigen epidemiologische Daten, dass im klinischen Alltag die Biologikamonotherapie keineswegs selten ist und rund 20 Prozent der mit Anti-TNF-Biologika behandelten Patienten sowie mehr als 30 Prozent der Patienten, die einen JAK-Inhibitor erhalten, kein MTX einnehmen (11).

Prospektiv wurde das Absetzen von MTX in Kombination mit Etanercept in der CAMEO-Studie untersucht. Die Studie verfehlte ihren primären Endpunkt und konnte für die Monotherapie die Nichtunterlegenheit nicht demonstrieren. Ein differenzierter Blick auf die Ergebnisse zeigt allerdings, dass bei Patienten, die unter der Kombinationstherapie eine niedrige Krankheitsaktivität erreichten, die Monotherapie mit dem Biologikum nicht schlechter war als die Kombination. Bei Patienten mit unzureichendem Ansprechen auf die Kombination kam es hingegen zu einem ungünstigeren Verlauf, wenn MTX abgesetzt wurde (12). Daraus könne man schliessen, so Kyburz, dass man MTX im Rahmen einer Biologikatherapie durchaus absetzen könne, dies allerdings nur bei Patienten mit niedriger Krankheitsaktivität – oder besser Remission.

Nicht zuletzt betonte Kyburz, dass das Management der RA nicht auf die Gelenke beschränkt bleiben dürfe, sondern auch wichtige Komorbiditäten zu berücksichtigen seien. So zeigen Patienten mit RA ein signifikant erhöhtes Risiko kardiovaskulärer Ereignisse (13). Die EULAR empfiehlt daher ein kardiovaskuläres Risikoassessment und ein intensiviertes Management der Risikofaktoren für alle RA-Patienten. Werden kardiovaskuläre Risikocharts verwendet, ist das Risiko für Patienten mit RA um den Faktor 1,5 zu multiplizieren. ▲

Reno Barth

Quelle: Vortrag «Moderne Basistherapie: Was ist wichtig?», beim Rheuma Top 2020, online am 27. August 2020.

Referenzen:

- Goekoop-Ruiterman YP et al.: DAS-driven therapy versus routine care in patients with recent-onset active rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis* 2010; 69(1): 65–69.
- Zufferey P et al.: Persistence of ultrasound synovitis in patients with rheumatoid arthritis fulfilling the DAS28 and/or the new ACR/EULAR RA remission definitions: results of an observational cohort study. *Joint Bone Spine* 2014; 81(5): 426–432.
- Haavardsholm EA et al.: Ultrasound in management of rheumatoid arthritis: ARCTIC randomised controlled strategy trial. *BMJ*. 2016; 354: i4205.
- Download unter https://www.eular.org/recommendations_management.cfm
- Singh JA et al.: Biologics for rheumatoid arthritis: an overview of Cochrane reviews. *Sao Paulo Med J* 2010; 128(5): 309–310.
- Taylor PC et al.: Baricitinib versus Placebo or Adalimumab in Rheumatoid Arthritis. *N Engl J Med* 2017; 376(7): 652–662.
- Fleischmann RM et al.: Safety and effectiveness of upadacitinib or adalimumab plus methotrexate in patients with rheumatoid arthritis over 48 weeks with switch to alternate therapy in patients with insufficient response. *Ann Rheum Dis* 2019; 78(11): 1454–1462.
- Singh JA et al.: Biologics for rheumatoid arthritis: an overview of Cochrane reviews. *Sao Paulo Med J* 2010; 128(5): 309–310.
- Nerviani A et al.: A Pauci-Immune Synovial Pathotype Predicts Inadequate Response to TNF α -Blockade in Rheumatoid Arthritis Patients. *Front Immunol* 2020; 11: 845.
- Mandelin AM et al.: Transcriptional Profiling of Synovial Macrophages Using Minimally Invasive Ultrasound-Guided Synovial Biopsies in Rheumatoid Arthritis. *Arthritis Rheumatol* 2018; 70(6): 841–854.
- Kyburz D et al.: Real-World Use of Tofacitinib in Rheumatoid Arthritis: Data from the Swiss Clinical Quality Management RA Registry. Presented at ACR 2016, Abstract 1637.
- Pope JE et al.: The Canadian methotrexate and etanercept outcome study: a randomised trial of discontinuing versus continuing methotrexate after 6 months of etanercept and methotrexate therapy in rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis* 2014; 73(12): 2144–2151.
- Lindhardsen JL et al.: The risk of myocardial infarction in rheumatoid arthritis and diabetes mellitus: a Danish nationwide cohort study. *Ann Rheum Dis* 2011; 70(6): 929–934.



Die EULAR-Empfehlungen zum RA-Management online

<https://ard.bmj.com/content/annrheumdis/79/6/685.full.pdf>