

Blickdiagnosen aus der Dermatologiepraxis

Wie lautet Ihre Diagnose?

In diesem Fotoquiz präsentiert Dr. Marguerite Krasovec Rahmann Fotos aus ihrer Dermatologiepraxis in Schlieren (ZH). Wählen Sie unter jeweils 3 Diagnosevorschlägen die passende Diagnose aus! Zur Überprüfung finden Sie die richtigen Lösungen am Schluss (Kasten im «Kopfstand»).



Abbildung 1:

Wählen Sie den passenden Lösungsvorschlag aus:

- a) Naevus
- b) Histiozytom
- c) Pilomatrixom



Abbildung 2: Wählen Sie den passenden Lösungsvorschlag aus:

- a) Zirkumskripte akrale Hypokeratose
- b) Morbus Bowen
- c) Porokeratose



Abbildung 3:
Wählen Sie den passenden Lösungsvorschlag aus:

- a) Psoriasis linearis
- b) Lymphangitis
- c) Blaschkitis



Abbildung 4:
Wählen Sie den passenden Lösungsvorschlag aus:

- a) Ekzem
- b) Ichthyose
- c) Psoriasis

Kasten im Kopfstand: Lösungen

Lösung zu Abbildung 1: Richtig ist b. Die Patientin klagt über ein leicht druckdolentes Knötchen, das seit Jahren vorhanden war. Bei dieser Anamnese ist vor allem zu denken an: Leiomyom, Gliomstumor, ektkrines Sprindanom, Piliomatixom oder Angiolipom. Die Histologie zeigte ein Histiozytom (Dermatofibrom).

Lösung zu Abbildung 2: Richtig ist a. Die zirkumskripte akute Hypokeratose ist eine sonderbare klinisch-pathologische Entität, die erstmals im Jahr 2002 beschrieben wurde. Sie ist charakterisiert durch einzelne oder multiple kreisförmige, eingesunkene, leicht gerötete Areale an den Handflächen oder den Fußsohlen. Histologisch besteht eine Anomalie des Stratum corneum mit abrupter Abnahme der Dicke und zentral dünnem Stratum corneum und Hypogranulose. Traumata werden als mögliche Auslöser in Erwägung gezogen. Die Diagnose dieser benignen Erkrankung mit in der Regel langfristigem Verlauf wird oft erst mit Verspätung gestellt.

Lösung zu Abbildung 3: Richtig ist c. Es bestand eine figurierte lineare, entlang den Blaschko-Linien verlaufende Dermatoze. Klinisch war dabei unter anderem an einen Lichen striatus oder an einen linearen Morbus Darier zu denken. Die Histologie zeigte eine entzündliche Reaktion, welche zusammen mit der Klinik gut zu einer Blaschkitis passte. Die Blaschkitis ist eine seltene Erkrankung Erwachsener um das 40. Lebensjahr herum. Sie zeigt sich mit linear angeordneten Papeln und Vesikeln entlang der Blaschko-Linien. Bei dieser Dermatoze kommt es im Verlauf von weniger als 2 Monaten zur Spontanresolution. Rezidive sind möglich. Die Ursache ist unbekannt.

Lösung zu Abbildung 4: Richtig ist a. Beim Exzikkationssekzem handelt es sich um eine toxisch bedingte Dermatoze. Der französische Ausdruck «Eczéma craquelé» beschreibt anschaulich die feinen Rhagaden und bogigen Hornschichteinrisse. Verursacht wird dieses Ekzem meist durch zu intensive Hautreinigungsprozeduren mit aggressiven Duschgels und Badzusätzen oder durch zu häufiges Waschen. Durch die ständige Entfernung der Haut kommt es zu einer Dekompensation der Hautrückfettungsprozesse, vor allem bei Sebostase. Möglicherweise spielte in diesem Fall zusätzlich noch ein allergisches Kontaktekzem eine verschlimmernde Rolle.